



Шляпка: Ширина 5-10 см, форма от конической до распростертой, с темным тупым бугорком в центре. Окраска блестящей в сырую погоду шляпки буро-желтоватая, по мере удаления от центра шляпки становится светлее. Мякоть желтоватая, довольно плотная, с мучнистым вкусом и горьковатым запахом.

Пластинки: Приросшие зубцом, широкие, в молодости светло-желтые, с возрастом темнеющие почти до коричневого цвета. Часто бывают покрыты темными крапинками.

Споровый порошок: Белый.

Ножка: Цилиндрическая, 7-15 см в длину и 0,5 - 1,5 см в толщину, неравномерно окрашенная (цветовая гамма соответствует шляпке), жесткая, волокнистая.

Распространение: Встречается в августе-сентябре в лиственных и смешанных лесах, образуя микоризу главным образом с микоризой. Встречается не так часто.

Сходные виды: Более или менее похожих видов немало - следует обратить внимание на нехарактерное для рядовок потемнение пластинок с возрастом. По описаниям (и только по описаниям) рядовку буро-желтую можно перепутать с рядовкой красной (*Tricholomopsis rutilans*), которая, впрочем, легко отличается по цвету пластинок - у красной рядовки они яично-желтого цвета.

Съедобность: Гриб, говорят, несъедобен из-за горького вкуса. В нашей деревне, впрочем, их называют "рыжиками", собирают без особой охоты, но всё же собирают.

Замечания автора: Один из сотен, если не из тысяч, труженников перегноя. В отличие от большинства из них, относительно легко поддается опознанию.