



**Шляпка:** 4-10 см в диаметре, у молодых экземпляров полушаровидная, компактная, затем приобретает аккуратную подушковидную форму. Окраска шляпки весьма изменчива; базовый колер - желто-бурый, на него накладываются ярко окрашенные прожилки красного или малинового цвета. В зависимости от частоты и окраски этих прожилок цвет шляпки может восприниматься в очень широком диапазоне, от оранжевого до бордового. Поверхность шляпки сухая, бархатистая. Мякоть желтая, толстая, мягкая, но не рыхлая, без особого запаха и с горьковатым, особенно у взрослых грибов, вкусом.

**Пластинки:** Частые, извилистые, относительно широкие, приросшие зубцом, характерного ярко-желтого цвета.

**Споровый порошок:** Белый.

**Ножка:** Высота 5-10 см, толщина - до 2,5 см, несколько утолщенная в основании, произвольно изогнутая, в молодости цельная, затем - выполненная и совсем полая. Поверхность - сухая, окрашенная примерно по той же схеме, что и шляпка, но с меньшим числом ярких волокон, от чего и кажется скорее желтой, чем красной. Мякоть ножки желтая, волокнистая, у основания более темная и грубая.

**Распространение:** Встречается с середины июля и до начала-середины октября в сосновых и смешанных (с сосной) лесах; всему предпочитает основательно перегнившие сосновые пни. Впрочем, попадает и на почве, на погруженном сосновом валежнике. Плодоносит, как правило, небольшими группами.

**Сходные виды:** "Попугайная" окраска и специфическое место обитания, сосновый пень, не дадут спутать *Tricholomopsis rutilans* с какими-либо другими сапрофитами. Встречается упоминание о близкородственной рядовке, *Tricholomopsis decora*, которая отличается от рядовки желто-красной отсутствием красных чешуек.

**Съедобность:** Незначительная.

**Замечания автора:** Рядовка желто-красная - один из многочисленных видов, которые, несмотря на всю свою распространенность, представляют для меня совершенную загадку. Причина - конечно, в сосне. С настоящими сосновыми лесами я практически незнаком. Лишь в последние годы начинает налаживаться какой-то контакт. Вот и осенью 2005 мы под руководством Андрея Богданова отправились куда-то на север, на границу московской и тверской областей, где в романтических и светлых сосновых борах бродят удивительные грибы. Увы, первый мой снимок оказался и последним: на яркой и приметной *Tricholomopsis rutilans* закончился заряд аккумуляторов. Честно говоря, будь у меня выбор, я лучше привез бы из экспедиции снимки различных млечников, практически мне не знакомых, моховиков, паутинников, а также колпака кольчатого. Надеюсь, рядовка желто-красная на меня за это не обидится.