

Статус. 2. Редкий вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Евразия от Скандинавии и Дании до долины Енисея. Встречается в большинстве районов области, но с очень низкой численностью. Гнездование известно на Верхней Мологе, в районе оз. Верестово, на Савцинском низинном болоте и в пойме р. Яхромы (Кашинский, Кесовогорский районы), на прибрежных лугах оз. Великое (Рамешковский район), Стаховском Мохе (Нелидовский район), в Фировском и Вышнево-лоцком районах, в районе Шошинского плеса Иваньков-ского вдхр., в окрестностях г. Твери и ряде других мест.

Численность. В XX столетии (особенно с 50-х гг.) отмечается резкий спад численности дупеля. Ранее гнез-дился в большом количестве на Верхней Мологе, Волго- Шошинской низине, в Приселигерье. В настоящее время в подходящих биотопах встречаемость вида сос-тавляет в среднем 0,03 ос. на 10 км маршрута.

Экология. Гнездится на пойменных и суходольных лугах, чередующихся с заболоченными ложбинами, на луговых островах среди низинных и верховых болот. Полигам, характерно ярко выраженное токовое поведение. В кладке 4 яйца. Питается личинками насекомых, дождевыми червями и другими беспозвоночными. Пере-летный вид.

Лимитирующие факторы. Проведение крупномас-штабных мелиоративных работ и распашка пойменных угодий, раннее сенокошение, натаскивание охотничьих собак в

местах гнездования, отстрел в период токования.

Меры охраны. Учет мест гнездования птиц и органи-зация особо охраняемых природных территорий, запре-щение весенней охоты, перенос сенокошения в местах гнездования на более поздние сроки (на июль) и регла-ментация пастбищной нагрузки.

