Статус. 4. Неопределенный по статусу вид.

Распространение. Евразия от Скандинавии до бассейна Колымы. В Тверской обл. имеется указание на гнездование этого вида в районе Иваньковского вдхр. Возмож но, сохранился на сырых лугах Шошинско-го плеса этого водохранилища. По данным охотоведов, встречается на Савцинском низинном болоте и прилегающих к нему пойменных угодьях р. Яхромы (Кашинский район). В прошлом апмечался на болотах Стаховский Мох и Жарковский Мох. Молодые птицы с недоразвитыми крыльями добывались у д. Черная Грязь и оз. Пудоро (Вьшшеволоцкий район), близ Твери и на Верхней Мологе.

Численность. Неизвестна. В 60-х годах XX века на Ива-ньковском вдхр. на 10 км маршрута встречалось в сред- нем 0,01 особи.

Экология. Поселяется на топких открытых участках болот, в заболоченных речных поймах и приозерных ложбина х. Гнездо в виде небольшого углубления. К ладка — 4 яйца. Питается червями, насекомыми, моллюсками. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Не выяснены. Вероятно, ес-тественные причины и осушение потенциальных место- обитаний.

Меры охраны. Специальные работы по уточнению сов-ременного состояния вида в области.